

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bayi Ny. S dengan Asfiksia Neonatorum di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* RSUD Prof Dr. W Z Johannes Kupang adalah sebagai berikut :

1. Saturasi oksigen bayi Ny. S sebelum dilakukan pemberian terapi CPAP pada hari pertama didapatkan hasil saturasi oksigen (SpO₂) yaitu 93%.
2. Saturasi oksigen bayi Ny. S sesudah dilakukan pemberian terapi CPAP pada hari kedua dan hari ketiga didapatkan hasil saturasi oksigen (SpO₂) yaitu 100%.
3. Penerapan terapi oksigen CPAP efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen pada bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum karena terjadi penurunan FiO₂.

5.2 Saran

1. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menjadi masukan maupun bahan evaluasi dalam pelaksanaan praktek keperawatan di rumah sakit.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, ketrampilan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhususnya dengan melakukan metode pendekatan asuhan keperawatan. Sedangkan diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian secara menyeluruh maupun keseluruhan dalam menggunakan metode asuhan keperawatan agar dapat tercapai dalam mengatasi masalah pada pasien yang didapatkan.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan

Diharapkan perawat dapat digunakan sebagai tambahan informasi maupun masukan dalam meningkatkan ilmu keperawatan dan ketrampilan dalam pemberian asuhan keperawatan.

