

Implementasi Perawatan Perineum Pada Ibu Post Partum Hari Ke-1 Untuk Menurunkan Resiko Infeksi Di Ruang Nifas Rsud Waikabubak

Beatrix Y. D. Gadi¹, , Ririn Widyastuti² Grasiانا Florida Boa³

ABSTRAK

Latar Belakang: Persalinan dapat menyebabkan terjadinya robekan perineum, jika perawatan perineum tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya resiko infeksi dilakukan tindakan perawatan perineum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan perawatan perineum pada ibu post partum hari ke-1 untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi di ruang Nifas RSUD Waikabubak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penulisan studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan. Sampel penelitian adalah 2 ibu post partum hari ke-1.

Hasil: penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada 2 ibu post partum hari ke-1 dapat mencegah terjadinya resiko infeksi dan meningkatkan pengetahuan tentang cara perawatan perineum yang benar. **Kesimpulan:** Dari penelitian ini adalah bahwa perawatan perineum dapat mencegah terjadinya resiko infeksi pada ibu post partum hari ke-1. Oleh karena itu perawatan perineum sangat penting dilakukan karena dapat menjadi salah satu cara yang digunakan mencegah terjadinya resiko infeksi kalau tidak dilakukan tindakan yang benar dapat menyebabkan komplikasi bahkan sampai kematian.

Kata Kunci : *Post Partum, Perawatan Perineum, Resiko Infeksi.*

