

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari 20 responden tertinggi berperan cukup dalam pengawasan menelan obat sbanyak 12 orang (60%), yang berperan baik dalam pengawasan menelan obat sebanyak 5 orang (25%) dan yang paling sedikit yang berperan kurang dalam pengawasan minum obat sebanyak 3 orang orang (15%). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berperan cukup baik sebagai pengawas menelan obat dan sebagai pendamping pemberian edukasi pada penderita TB Paru.

6.2 Saran

1. Bagi Puskesmas kawangu

Di harapkan petugas Puskesmas dapat meningkatkan dalam memberikan pendidikan kesehatan secara konsisten terutama tentang peran keluarga sebagai pengawas menelan obat dengan tingkat keberhasilan pengobatan penderita tuberkolosis di wilayah kerja puskesmas kawangu

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan untuk memperkaya referensi kepustakaan tentang peran keluarga sebagai pengawas menelan obat dengan tingkat keberhasilan

pengobatan penderita tuberkolosis di wilayah kerja puskesmas kawangu.

3. Bagi Peneliti

Memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian tentang peran keluarga sebagai pengawas menelan obat.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi lanjutan dan pengembangan pada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Peran keluarga sebagai pengawas menelan obat.