

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Gambaran Jumlah Leukosit perokok Aktif Pada masyarakat di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata jumlah leukosit dari total responden sebanyak 30 responden adalah sebesar 8.107 u/L .
2. Jumlah leukosit berdasarkan usia 20-30 tahun sebanyak (56,7%) responden memiliki jumlah leukosit yang normal dan sebanyak (10%) responden memiliki jumlah leukosit yang tinggi. Sedangkan pada usia 31-40 tahun menunjukkan sebanyak (23,3%) responden memiliki jumlah leukosit yang normal dan (10%) responden memiliki jumlah leukosit yang tinggi.
3. Jumlah leukosit berdasarkan pekerjaan, pada responden yang bekerja sebagai wiraswasta ditemukan sebanyak (30%) responden memiliki jumlah leukosit yang normal dan sebanyak (16,7%) responden memiliki jumlah leukosit yang tinggi, pada responden yang bekerja sebagai pegawai ditemukan (13,3%) responden memiliki jumlah leukosit yang normal dan hanya (3,3%) responden saja yang jumlah leukosit, sedangkan pada mahasiswa sebanyak (36,7%) responden jumlah leukositnya normal dan tidak mengalami peningkatan.
4. Jumlah leukosit berdasarkan lama merokok 5-10 tahun, sebanyak (73,4%) responden memiliki jumlah leukosit yang normal dan (3,3%)

responden saja yang mengalami peningkatan. Pada 11-15 tahun, sebanyak (16,7%) mengalami peningkatan dan hanya (3,3%) responden saja yang jumlah leukositnya normal dan pada responden >15 tahun ditemukan (3,3%) responden dengan jumlah leukosit normal.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah sampel yang lebih banyak untuk melihat gambaran jumlah leukosit pada perokok aktif.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian pada parameter hitung jenis leukosit.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan lagi terkhususnya pada pemeriksaan darah lengkap.