

BAB 5

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemberian terapi oralit dan zinc dapat mengatasi masalah diare yang terjadi pada anak. efektivitas terapi oralit dan zinc dalam penanganan diare pada anak dilakukan dengan membandingkan kondisi klinis partisipan sebelum dan sesudah pemberian terapi. Berdasarkan temuan lapangan, kedua partisipan menunjukkan perubahan yang signifikan dalam waktu tiga hari setelah mendapatkan terapi. Dengan tercapainya indikator keberhasilan yaitu penurunan frekuensi buang air besar yang awalnya lebih dari tiga kali per hari, nafsu makan kembali membaik, CRT < 2 detik, mukosa mulut dan bibir menjadi lembab dan tanda vital dalam rentang normal.

1.2 Saran

1.2.1 Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan, keterampilan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah partisipan agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasikan dan juga melakukan pemantauan dalam jangka waktu yang lebih lama guna mengevaluasi efek jangka panjang dari pemberian zinc terhadap kekambuhan diare.

1.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa jurusan keperawatan.

1.2.3 Bagi Masyarakat (Partisipan dan Keluarga)

Masyarakat, khususnya orang tua balita, diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai penanganan awal diare di rumah.