

INFORMED CONSENT

(Persetujuan Menjadi Partisipan)

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : Saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai studi kasus yang akan dilakukan oleh: **Maria Yasinta Menteng** , Dengan judul: **Asuhan Keperawatan Pada Ibu Nifas Post Sectio Caeserea Dengan Indikasi Preeklampsia Berat Di Ruang Nifas III Rsud Ende**

Saya setuju untuk ikut berpartisipasi pada studi kasus ini secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Apabila selama penelitian studi kasus ini saya mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun .

Saksi



Keluarga

Ende, 03 februari 2025
Yang Memberi Persetujuan



Ny. Jamila More

Peneliti



Maria Yasinta Menteng
NIM.PO5303202220020

PENJELASAN SEBELUM SEBELUM PENELITIAN STUDI KASUS

1. Saya adalah mahasiswa dari Poltekes Kemenkes Kupang Program Studi D-III Keperawatan Ende, dengan ini meminta Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam studi kasus yang berjudul Asuhan Keperawatan Pada Ny. J. M. Post *Sectio Caeserea* Dengan Indikasi Preeklampsia Berat Di Ruang Nifas III RSUD Ende.
2. Tujuan dari Studi Kasus ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan Asuhan Keperawatan Pada Ny. J. M. Post *Sectio Caeserea* Dengan Indikasi Preeklampsia Berat Di Ruang Nifas III RSUD Ende. Studi Kasus ini berlangsung selama tiga hari.
3. Prosedur pelaksanaan berupa Asuhan Keperawatan (pengkajian/pengumpulan data, perumusan diagnosa, penetapan rencana/intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan) yang akan berlangsung kurang lebih 20-30 menit setiap kali pertemuan. Cara ini mungkin menyebabkan ketidaknyamanan tetapi tidak perlu khawatir karena Studi Kasus ini tidak akan menimbulkan masalah kesehatan atau memperburuk status kesehatan Bapak/Saudara.
4. Keuntungan yang Bapak/Ibu/Saudara peroleh dari keterlibatan dalam Studi Kasus ini adalah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan pelayanan keperawatan yang lebih baik dan turut terlibat aktif mengikuti perkembangan Asuhan yang diberikan.

5. Namun dari jati diri serta seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Saudara sampaikan akan selalu dirahasiakan.
6. Jika Bapak/Ibu/Saudara membutuhkan informasi terkait dengan studi kasus ini silahkan menghubungi saya pada nomor hp: 081246404418

Ende, 23 Januari 2025
Peneliti

Maria Yasinta Menteng
PO5303202220020



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba-Kupang, Telp: (0380) 8800256

Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com

FORMAT PENGKAJIAN IBU POST PARTUM/ NIFAS

I. PENGKAJIAN

Hari/ tanggal :Sabtu 01 februari 2025.....

Oleh : Maria Yasinta Menteng

A. Identitas

Nama Ibu	Ny. J.M.
Umur	39 Tahun
Pendidikan	SD
Pekerjaan	IRT
Alamat	Nila
Tanggal Partus	01 Februari 2025
Jenis Partus	<i>Sectio Caesere</i> + MOW
Nama Suami	Tn. Z.A.
Umur	36 Tahun
Pendidikan	SD
Alamat	Nila

B. Riwayat Kesehatan

1. Keluhan Utama

Klien mengatakan nyeri pada area *insisi* dinding abdomen serta mengatakan kepala sakit dan pusing.

2. Riwayat Kesehatan Sekarang

Klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi dari tahun 2022 yang lalu dan sering mengeluh kepala sakit dan pusing. Klien mengatakan sering mengonsumsi makanan tinggi purin seperti *seafood* (kepiting dan udang) dan klien juga mengatakan jarang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Manulando sampai pada saat klien mengandung anak yang kedua sehingga pada saat bersalin harus dilakukan dengan tindakan *Sectio Caesear* karena klien dengan diagnosa medis Preeklampsia Berat. Pada tanggal 01 februari klien bersalin dengan tindakan *Sectio Caesear* di ruangan OK pada pukul 14.30 WITA dan dipindahkan ke ruang Nifas III pada pukul 15.30 WITA untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

3. Riwayat Kesehatan Dahulu

Klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi dari tahun 2022 yang lalu pada saat klien memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Manulando dan tidak ada pengobatan yang dilakukan, klien juga mengatakan jarang untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan karena jarak fasilitas kesehatan dan rumah lumayan jauh.

C. Riwayat Obstetri G: 2 P: 1 A :0

NO	UMUR	L/P	H/M	BBL	CARA LAHIR	PENOLONG
1	9 Bulan	L	H	-	Spontan	Dukun
2	Hamil					

D. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Gangguan pada hamil muda

Klien mengatakan sering mual muntah dan pusing dan kepala sakit pada kehamilan trimester pertama (1-3 bulan kehamilan).

2. Tempat memeriksakan kehamilan

Klien mengatakan selama hamil melakukan pemeriksaan sebanyak 2x di Puskesmas Manulando.

3. Obat yang diberikan

Klien mengatakan vitamin dan Tablet tambah darah (TTD).

4. Nutrisi selama hamil

Klien mengatakan selama hamil mengonsumsi makanan TKTP (Nasi, sayuran hijau, ikan, tahu-tempe, buah-buahan) dan sering konsumsi *seafood* (kepiting dan udang), minum kopi dan teh 2-3 kali dalam seminggu pada saat pagi hari dan juga biasanya minum saat sore hari jika ada yang berkunjung, minum air putih 5-6 gelas sehari.

E. Riwayat persalinan

1. Jenis persalinan

Persalinan *Sectio Caesarea* + Mow (Metode Operasi Wanita).

2. Lama persalinan

1 jam (13.30-14.30).

3. Jumlah perdarahan

300 cc.

4. Keadaan umum

Keadaan umum klien baik, GCS : E: 4, V: 5, M: 6, kesimpulannya :

Kesadaran klien Composmentis

F. Riwayat Kontrasepsi

1. Jadi akseptor / tidak : klien mengatakan tidak pernah menjadi akseptor.
2. Jenis kontrasepsi : Alami
3. Lama : 10 Tahun
4. Keluhan selama menjadi akseptor: klien mengatakan tidak ada keluhan.

G. Data Psikologis

1. Konsep diri

a. Kepuasan ibu terhadap kelahiran :

Klien mengatakan sangat puas karena bayinya lahir dengan sehat dan selamat.

b. Penerimaan diri ibu :

Klien mengatakan menerima keadaan dirinya saat ini walaupun ada beberapa perubahan fisik pada dirinya.

c. Harga diri :

1) Perubahan apa yang ibu rasakan setelah mengalami persalinan :

Perubahan apa saja yang ibu rasakan setelah mengalami persalinan Klien mengatakan payudara membesar, kencang, pada dinding abdomen ada insisi, perubahan emosional,

perubahan dalam pola.

- 2) Kesesuaian antara harapan dan kenyataan : Klien mengatakan harapannya sesuai kenyataan bayinya lahir dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Pengalaman melahirkan: Bagaimana persepsi ibu terhadap pengalaman melahirkan
3. Kecemasan.
 - a. Apa respon ibu jika bayi sakit :
Klien mengatakan sudah pernah melahirkan tapi dengan cara yang spontan dan dibantun oleh dukun.
4. Konflik peran
 - a. Apakah ibu menerima peran sebagai ibu
klien mengatakan sangat menerima perannya sebagai ibu.
 - b. Bagaimana dengan pekerjaan ibu
klien mengatakan pekerjaannya tidak terganggu.

H. Pemenuhan kebutuhan dasar

- a. Nutrisi : TKTP dan diet rendah garam
- b. Eliminasi : Menggunakan kateter
- c. Oksigenasi : tidak terpasang oksigenasi
- d. Aktivitas dan istirahat

Aktivitas dan istirahatnya terganggu karena adanya nyeri, terpasang infus 2 jalur pada kedua tangan dan serta klien masih dalam keadaan lemah, efek anastesi.

e. Pola Persepsi

Klien kurang kooperatif seperti tidak mau pada saat dipasang infus, di lakukan pengukuran tekanan darah, pada saat melakukan perawatan payudara dan pijat oxitocyn.

f. Pola *kognitif* dan Persepsi

Pemeriksaan pada bagian mata, klien mengatakan penglihatan masih bagus Kemudian pada bagian telinga, klien mengatakan mampu mendengar dengan baik. Selanjutnya pemeriksaan lidah, klien mengatakan mampu mengecap dengan baik. untuk bagian kulit klien mengatakan mampu merasakan sentuhan.

g. Pola Nilai-Kepercayaan

Klien mempercayai adanya Tuhan, klien menganut agama Islam.

I. Pemeriksaan fisik

Keadaan umum : klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda – tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2 : 96%, RR: 20x/m, CRT :<3 detik. Pada **Kepala** : kulit kepala sedikit kotor, rambut bergelombang, tidak ada lesi, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. **Leher** : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe, tidak ada nyeri tekan. **Mata** : bentuk mata simetris, tampak kantong mata, konjungtiva merah muda, sklera non ikterik. **Hidung** : simetris, tidak ada pembengkakan. **Mulut** : Mukosa bibir tampak lembab, klien berbicara

jelas, tidak ada lesi, perdarahan dan juga bengkak. **Dada** : inspeksi : bentuk dada simetris, tidak ada pembengkakan, payudara simetris, membesar, puting susu menonjol, aerola hitam, tidak keluar asi pada saat di tekan, RR: 20x/m. **Abdomen** : inspeksi : bentuk simetris, bersih, tampak ada linea nigra, striae, tampak luka tertutup kasa + hipafix, peristaltik usus :18x/m, kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, nyeri pada saat di tekan. **Genetalia** : inspeksi : jenis lochea rubra, perineum utuh dan terpasang kateter, volume urine 500 cc, warna urine kuning teh. **Ekstremitas** : pada kedua tangan tampak terpasang infus RI drip + MgSo4 + oksitosin, jumlah tetesan infus 24 tpm, akral hangat. Pada ekstremitas bawah tampak sedikit edema, jari kaki lengkap, dan kekuatan otot baik.

J. Pemeriksaan penunjang

II. Tabel 4.2 Pemeriksaan darah lengkap

III. Hasil laboratorium tanggal 31 januari 2025

No	Jenis pemeriksaan	Nilai normal	Satuan	Hasil pemeriksaan
1	WBC (<i>Leukosit</i>)	3.60 – 11,0	$10^3/\mu\text{L}$	13,2
2	RBC (<i>Eritrosit</i>)	3.80 – 5.20	$10^6/\mu\text{L}$	4,68
3	HGB	11.7 – 15.5	g/dl	11.8
4	HCT	35.0 – 47.0	%	36,4
5	MCV	80.0– 100	fL	77.8
6	MCH	27.0– 34.0	Pg	25.2
7	MCHC	26.0 – 34.0	g/dl	32.4
8	PLT(<i>Trombosit</i>)	150 -440	$10^3/\mu\text{L}$	272
9	RDW	11.5 – 14.5	%	13,3
10	MPV	9.0 – 13.0	fL	10,7
11	LYMPH%	25.0– 40.0	%	19.6
12	NEUT%	50.00-70.00	%	73.2
13	LYM%	25.0-40.0	%	19.6

Tabel 4.3 Pemeriksaan darah lengkap
Hasil laboratorium tanggal 01 februari 2025

No	Jenis pemeriksaan	Nilai normal	Satuan	Hasil pemeriksaan
1	WBC (<i>Leukosit</i>)	4,0 – 10,0	10 ³ /μL	19,9
2	RBC (<i>Eritrosit</i>)	4.00 – 5.00	10 ⁶ /μL	4,48
3	HGB	11.7 – 15.5	g/dl	12.2
4	HCT	35.0 – 47.0	%	36,6
5	MCV	80.0– 103.4	fL	82.1
6	MCH	27.0– 34.0	Pg	27.2
7	MCHC	32.0 – 36.0	g/dl	33.2
8	PLT(<i>Trombosit</i>)	150 -400	10 ³ /μL	300
9	RDW	11.0 – 16.0	%	13,2
10	MPV	6.5 – 12.0	fL	8,3
11	LYMPH%	20.0– 40.0	%	16.6
12	MID%	3.0 – 15.0	%	7.7
13	LYM	0.8 – 4.0	10 ³ /μL	3.3

Pemeriksaan urine lengkap
Tabel 4.4 Tanggal 31-02-2025

No	Jenis pemeriksaan	Hasil hematologi	Nilai rujukan
1	Glukosa	-	<30 mg/dl
2	Bilirubin	-	0,02 mg/dl
3	Ph	6.5	4,6-8,0
4	Protein	Neg	< 15 mg/dl
5	Urobilin	Normal	<1,0 mg/dl
6	Nitrit	-	Neg
7	Leukosit esterase	-	Neg

Tabel 4.5 Terapi

No	Nama obat	Kegunaanya
1	Paracetamol	Meredakan nyeri dan menurunkan demam
2.	Ketorolax	Meredakan nyeri
3.	Asam mefenamat	Meredakan nyeri
4.	Nifedipine	Menurunkan tekanan darah tinggi
5.	MgSo4	Untuk mengatasi Preeklampsia
6.	Oxitosin	Memperkuat kontraksi dinding Rahim

k. Tabulasi data

Klien mengatakan nyeri pada insisi dinding abdomen, dengan karakteristik nyeri P: luka post operasi *Sectio Caesarea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah insisi dinding abdomen, S: skala nyeri 4 kualitas nyeri 6, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak, klien mengatakan pusing, sakit kepala, klien mengatakan belum bisa melakukan aktivitas, klien mengatakan nyeri pada saat di tekan payudaranya, klien mengatakan kurang nyaman karena terpasang kateter, klien mengatakan tidak mau di pasang infus karena sakit, klien mengatakan tidak mau di lakukan pengukuran tekanan darah karena keram dan juga klien tidak mau dilakukan perawatan payudara, tampak meringis, klien tampak kurang kooperatif dalam perawatan seperti tidak mau pada saat dipasang infus, ukur tekanan darah dan pada saat melakukan perawatan luka, pada kedua kaki tampak sedikit edema, Keadaan umum : klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), pada kedua tangan tampak terpasang infus Rl drip + MgSo4 + oksitosin, jumlah tetesan infus 24 tpm, akral hangat. payudara membesar, bendungan Asi, Asi tidak keluar, Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0° C SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT :≤ 3, tampak luka tertutup kasa + hipafix, peristaltik usus :18x/m, kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah

pusat, lochea rubra, perineum utuh dan terpasang kateter, volume urine 500 cc, warna urine kuning teh.

I. Klasifikasi data

Ds : klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen, dengan karakteristik nyeri P: luka post operasi *Sectio Caeserea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah insisi dinding abdomen, S: skala nyeri 4 kualias nyeri 6, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak, klien mengatakan pusing, sakit kepala, klien mengatakan belum bisa melakukan aktivitas, klien mengatakan nyeri pada saat di tekan payudaranya klien mengatakan tidak mau di pasang infus karena sakit, klien mengatakan kurang nyaman karena terpasang kateter, klien mengatakan tidak mau di lakukan pengukuran tekanan darah karena keram dan juga klien tidak mau dilakukan perawatan payudara.

Do : Tampak meringis, tampak sedikit edema pada kedua kaki, klien tampak kurang kooperatif dalam perawatan seperti tidak mau pada saat dipasang infus, ukur tekanan darah dan pada saat melakukan perawatan luka, Keadaan umum : klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengiikuti perintah), pada kedua tangan tampak terpasang infus Rl drip + MgSo4 + oksitosin, jumlah tetesan infus 24 tpm, akral hangat, payudara membesar, bendungan Asi, Asi tidak keluar, Tanda –tanda vital : TD: 154/89

mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 ° C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3, tampak luka tertutup kasa + hipafix, peristaltik usus :18x/m, kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra, perineum utuh dan terpasang kateter, volume urine 500 cc, warna urine kuning teh.

m. Analisa Data

Tabel 4.6 Analisa Data

No	Data Fokus Subyektif (S) Obyektif (O)	Etiologi	Problem
1.	Ds: klien mengatakan sakit kepala Do: Tampak sedikit edema pada kedua kaki klien, tekanan Darah meningkat : 154/89 mmHg, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤3detik, lochea rubra.	Hipertensi	Perfusi cerebral tidak efektif
2.	Ds: klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen dengan karakteristik nyeri P: luka post operasi <i>Sectio Caeserea</i> pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah insisi dinding abdomen, S: skala nyeri 4 kualias nyeri 6, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak. Do : tampak meringis, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti	<i>Insisi</i> dinding abdomen	Gangguan nyaman nyeri

Lanjutan Tabel 4.6 Analisa Data

	perintah). TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3, tampak luka tertutup kasa + hipafix, peristaltik usus :18x/m, kontraksi uterus baik), tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.		
3.	Ds : klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen Do : tampak luka tertutup kasa + hipafix, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0°C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.	Luka <i>insisi</i> dinding abdomen	Gangguan integritas kulit
4.	Ds : klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen Do : tampak luka tertutup kasa + hipafix, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0°C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.	Luka <i>insisi</i> dinding abdomen	Risiko infeksi
5.	Ds : klien mengatakan nyeri pada saat di tekan payudaranya Do : payudara membesar, bendungan Asi, Asi tidak keluar, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15	Ketidakadekuatan suplai Asi	Menyusui tidak efektif

Lanjutan Tabel 4.6 Analisa Data

	dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.		
6.	Ds : klien mengatakan kurang nyaman karena terpasang kateter. Do : tampak terpasang kateter, volume urine 500 cc, warna urine kuning teh. klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0°C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.	Efek anastesi	Perubahan eliminasi urine
7.	Ds : klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen, klien mengatakan pusing, klien juga mengatakan belum bisa melakukan aktivitas. Ds : pada kedua tangan tampak terpasang infus RI drip + MgSo4 + oksitosin, jumlah tetesan infus 24 tpm, akral hangat, klien sadar penuh,kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0°C, SpO2: 96%, RR:	Nyeri Luka <i>insisi</i> dinding abdomen dan keterbatasan gerak karena terpasang infus pada kedua tangan serta kateter	Intoleransi aktifitas

Lanjutan Tabel 4.6 Analisa Data

	20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.		
8.	<p>Ds : klien mengatakan tidak mau di pasang infus karena sakit, klien mengatakan tidak mau di lakukan pengukuran tekanan darah karena keram dan juga klien tidak mau dilakukan perawatan payudara.</p> <p>Do : klien tampak dalam perawatan seperti tidak mau pada saat dipasang infus, ukur tekanan darah dan pada saat melakukan perawatan luka, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.</p>	Kurang kooperatif dalam perawatan	Defisit pengetahuan

n. Prioritas masalah

1. Perfusi serebral tidak efektif
 2. Gangguan Nyaman Nyeri
 3. Gangguan integritas kulit
 4. Risiko infeksi
 5. Menyusui tidak efektif
 6. Perubahan eliminasi urine
 7. Intoleransi aktifitas
 8. Defisit pengetahuan
3. Diagnosa keperawatan

- a. Perfusi Cerebral tidak efektif berhubungan dengan Hipertensi dibuktikan dengan Ds: klien mengatakan kepala sakit, Do: Tampak sedikit edema pada kedua kaki, tekanan darah meningkat : 154/89 mmHg, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.
- b. Gangguan nyaman nyeri berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen ditandai dengan Ds: klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding dengan karakteristik nyeri P: luka post operasi *Sectio Caeserea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah *insisi* dinding abdomen, S: skala nyeri 4 kualias nyeri 6, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak. abdomen, Do : tampak meringis, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah). Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3, tampak luka tertutup kasa + hipafix, peristaltik usus :18x/m, kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.

- c. Gangguan *integritas* kulit berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen ditandai dengan Ds : klien mengatakan nyeri pada insisi dinding abdomen, Do : tampak luka tertutup kasa + hipafix, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.
- d. Risiko infeksi berhubungan dengan luka *insisi* dinding abdomen dibuktikan dengan Ds : klien mengatakan nyeri pada insisi dinding abdomen, Do : tampak luka tertutup kasa + hipafix, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.
- e. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai Asi ditandai dengan Ds : klien mengatakan nyeri pada saat di tekan payudaranya, Do : payudara membesar, bendungan Asi, Asi tidak keluar, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5

(spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda – tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.

- f. Perubahan eliminasi urine berhubungan dengan efek anastesi ditandai dengan Ds : klien mengatakan kurang nyaman karena terpasang kateter. Do : tampak terpasang kateter, volume urine 500 cc, warna urine kuning teh. klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda – tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO2: 96%, RR: 20x/m, CRT \leq 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.
- g. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan Nyeri Luka *insisi* dinding abdomen dan keterbatasan gerak karena terpasang infus pada kedua tangan serta kateter ditandai dengan Ds : klien mengatakakan nyeri pada insisi dinding abdomen, klien mengatakan pusing, klien juga mengatakan belum bisa melakukan aktivitas, Ds : pada kedua tangan tampak terpasang infus RI drip + MgSo4 + oksitosin, jumlah tetesan infus 24 tpm, akral hangat, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C,

SpO₂: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.

- h. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang kooperatif ditandai dengan Ds : klien mengatakan tidak mau di pasang infus karena sakit, klien mengatakan tidak mau di lakukan pengukuran tekanan darah karena keram dan juga klien tidak mau dilakukan perawatan payudara, Do : klien tampak tidak mau saat dilakukan perawatan seperti tidak mau pada saat dipasang infus, ukur tekanan darah dan pada saat melakukan perawatan luka, klien sadar penuh, kesadaran composmentis, nilai GCS 15 dengan respon eye 4 (membuka mata spontan), respon verbal 5 (spontan bicara), dan respon motorik 6 (mengikuti perintah), Tanda –tanda vital : TD: 154/89 mmHg, Nadi: 83x/m, suhu: 37,0 °C, SpO₂: 96%, RR: 20x/m, CRT ≤ 3 kontraksi uterus baik (konsistensinya keras) , tinggi fundus uterus 2 jari dibawah pusat, lochea rubra.

4. Intervensi keperawatan (SIKI 2018)

- a. Perfusi cerebral tidak efektif

Tujuan : setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan risiko perfusi cerebral tidak efektif tidak terjadi. Dengan kriteria hasil yang didapatkan : Tekanan darah normal, pusing menurun, kejang menurun, tegang leher menurun.

Pemantauan Tekanan Intrakranial

Observasi:

1) Monitor peningkatan TD

Rasional : Peningkatan tekanan darah dapat menjadi tanda kompensasi tubuh terhadap peningkatan tekanan intrakranial, untuk mempertahankan perfusi cerebral

2) Monitor penurunan tingkat kesadaran

Rasional : Penurunan kesadaran adalah indikator awal adanya peningkatan TIK, herniasi otak, atau kerusakan pada saraf kranial.

3) Monitor perlambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil

Rasional : Perubahan respon pupil bisa mengindikasikan peningkatan TIK.

4) Monitor tekanan perfusi serebral

Rasional : Memonitor tekanan perfusi cerebral membantu memastikan bahwa otak menerima aliran darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.

5) Monitor efek stimulus lingkungan hidup terhadap TIK

Rasional : Untuk mengelola faktor – faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi TIK dan kondisi pasien.

Terapeutik:

1) Pertahankan sterilitas sistem pemantauan

Rasional : Dengan mempertahankan sterilitas sistem pemantauan, tim kesehatan dapat memastikan keselamatan pasien dan mengoptimalkan hasil perawatan.

2) Pertahankan posisi kepala dan leher netral

Rasional : Posisi kepala yang netral dapat membantu mengurangi tekanan intrakranial dan meningkatkan aliran darah ke otak.

3) Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien

Rasional : Pemantauan yang lebih sering dapat membantu mendeteksi perubahan kondisi pasien.

4) Dokumentasikan hasil pemantauan

Rasional : dokumentasi hasil pemantauan memungkinkan untuk mengevaluasi perawatan yang diberikan dan indentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Edukasi:

1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan

Rasional : Menjelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perawatan yang diberikan.

2) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu

Rasional : Menginformasikan hasil pemantauan dapat membangun atau meningkatkan kepercayaan serta komunikasi antara pasien dan tim kesehatan.

3) Diet rendah garam

Rasional : Diet rendah garam dapat membantu mengurangi retensi cairan dalam tubuh dan dapat membantu mengurangi gejala pembengkakan dan sesak napas.

b. Gangguan nyaman nyeri

Tujuan : setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan gangguan nyaman nyeri teratasi, kriteria hasil yang di dapatkan Nyeri di area insisi menurun, tekanan darah membaik, tekanan nadi membaik.

Manajemen Nyeri

Observasi

1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri

Rasional: Identifikasi frekuensi nyeri membantu dalam menentukan penyebab nyeri.

2) Identifikasi skala nyeri

Rasional: Skala nyeri menyediakan cara untuk mengukur dan mendokumentasikan tingkat nyeri

3) Identifikasi respons nyeri non verbal

Rasional: Respon non-verbal seperti mimik wajah, gerakan tubuh, dapat memberikan petunjuk penting tentang tingkat nyeri

4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional: Faktor-faktor ini memungkinkan sebagai pemicu yang dapat memperberat dan memperingan nyeri

5) Monitor efek samping penggunaan analgetik

Rasional: Memantau efek samping analgetik memungkinkan memiliki efek samping yang sangat serius.

Terapeutik

6) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis, terapi musik, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres dingin/hangat, terapi bermain)

Rasional: Lepaskan tegangan emosional dan otot; tingkatkan perasaan control yang mungkin dapat meningkatkan kemampuan coping.

7) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)

Rasional: Lingkungan yang nyaman dan tenang dapat memperingan nyeri

8) Fasilitasi istirahat dan tidur

Rasional: Tidur yang cukup dan berkualitas dapat mengurangi persepsi nyeri.

Edukasi

9) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

Rasional: Menjelaskan penyebab nyeri pada pasien meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien.

10) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri

Rasional: Memantau nyeri secara mandiri membantu pasien menjadi lebih sadar akan nyeri yang pasien rasakan.

11) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Rasional: Lepaskan tegangan emosional dan otot; tingkatkan perasaan kontrol yang mungkin dapat meningkatkan kemampuan coping.

Kolaborasi

12) Kolaborasi penggunaan analgetik bila perlu

Rasional: menghilangkan rasa nyeri

13) Observasi efek analgetik.

Rasional: Respirasi mungkin menurun pada pemberian narkotik, dan mungkin menimbulkan efek-efek sinergistik dengan zat-zat anestesi

c. Kerusakan integritas kulit

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan kerusakan integritas kulit teratasi, kriteria hasil yang di dapatkan : luka pada area insisi membaik.

Perawatan Luka

Observasi:

- 1) Monitor karakteristik luka (mis. Drainase, warna, ukuran, bau)

Rasional: Perubahan pada karakteristik luka, seperti kemerahan, bengkak, peningkatan rasa nyeri, keluarnya nanah, atau bau tidak sedap, bisa menjadi tanda infeksi

- 2) Monitor tanda-tanda infeksi

Rasional: Mengidentifikasi tanda-tanda infeksi secara dini seperti demam, kemerahan, pembengkakan, nyeri atau keluarnya cairan dari luka memungkinkan tindakan cepat sebelum infeksi menyebar atau menjadi lebih parah.

Terapeutik:

- 3) Lepaskan balutan dan plester secara perlahan

Rasional: Proses pelepasan secara perlahan dapat mengurangi ketidaknyamanan atau rasa sakit yang dialami pasien.

- 4) Bersihkan dengan cairan NaCl, sesuai kebutuhan

Rasional: Cairan NACL membantu menjaga kelembaban di area luka dan membantu mencegah infeksi.

- 5) Berikan salep yang sesuai ke kulit/lesi, jika perlu.

Rasional: Salep yang diformulasikan untuk kondisi tertentu dapat membantu mempercepat proses penyembuhan

baik dengan memperbaiki jaringan, menghidrasi kulit atau mendukung regenerasi sel.

6) Pasang balutan sesuai jenis luka

Rasional: Balut yang tepat melindungi luka dari kotoran, bakteri dan trauma eksternal yang dapat mengurangi resiko infeksi dan mempercepat penyembuhan.

7) Berikan diet dengan kalori 30-35 kkal/kgBB/hari dan protein 1,25-1,5 g/kgBB/hari

Rasional: Menyediakan kalori dan protein dalam jumlah yang tepat mendukung pemulihan dan kesehatan pasien.

8) Berikan suplemen vitamin dan mineral (mis. vitamin A, vitamin C, Zinc, asam amino) sesuai indikasi.

Rasional: Suplemen vitamin dan mineral membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang memungkinkan serta mendukung dalam proses penyembuhan.

Edukasi:

9) Jelaskan tanda dan gejala infeksi

Rasional: Tanda-tanda infeksi seperti demam, bengkak, kemerahan, nyeri atau keluarnya nanah, memungkinkan pasien dan keluarga untuk mengenali perubahan.

Kolaborasi

10) Kolaborasi pemberian antibiotik, jika perlu

Rasional: Mempercepat penyembuhan.

d. Risiko infeksi

Tujuan : setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan risiko infeksi tidak terjadi, kriteria hasil yang di dapatkan : perdarahan menurun, luka pada daerah insisi membaik.

Pencegahan infeksi

Observasi:

1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik

Rasional: Memantau tanda vital seperti suhu, tekanan darah , denyut nadi, dan pernapasan dapat membantu mendeteksi komplikasi sistemik seperti infeksi.

2) Uji kesterilan semua peralatan:

Rasional: Benda –benda yan dipaket mungkin tampak steril, meskipun demikian, setiap benda harus secara teliti diperiksa kesterilanya, adanya kerusakan pada pemaketan, efek lingkungan pada paket, dan teknik pengiriman. Sterilisasi paket/tanggal kadaluarsa, nomor lot/seri harus dokumentasikan jika perlu.

Terapeutik:

3) Batasi jumlah pengunjung

Rasional: Semakin banyak orang yang datang, semakin tinggi resiko penyebaran infeksi baik kepada pasien yang

mungkin memiliki system kekebalan tubuh lemah maupun kepada pengunjung itu sendiri.

4) Berikan perawatan kulit pada area edema

Rasional: Edema menyebabkan penumpukan cairan di jaringan, sehingga kulit di area tersebut menjadi lebih tegang, tipis, dan rentan terhadap kerusakan seperti pecah-pecah atau ulserasi

5) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien

Rasional: Tangan adalah salah satu media utama penularan kuman, termasuk bakteri dan virus.

6) Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi

Rasional: Pasien yang berisiko tinggi, seperti pasien dengan system imun yang lemah, pasien pasca operasi sangat rentan terhadap infeksi.

Edukasi:

7) Jelaskan tanda dan gejala infeksi

Rasional: Dengan memahami tanda dan gejala infeksi pasien dan keluarga dapat mengenali perubahan secara cepat yang memungkinkan mereka segera melapor kepada tenaga kesehatan

8) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi

Rasional: Nutrisi yang adekuat memberikan tubuh energy dan zat-zat penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, penyembuhan luka dan mengatasi infeksi.

9) Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Rasional: Cairan penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi terutama pada pasien yang kehilangan cairan berlebihan

Kolaborasi :

10) Kolaborasi pemberian antibiotik

Rasional: Dapat diberikan secara profilaksis bila di curigai terjadinya infeksi atau kontaminasi.

e. Menyusui tidak efektif

Edukasi Menyusui

Tujuan : setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan risiko menyusui tidak efektif tidak terjadi.
kriteria hasil yang di dapatkan :Puting susu menonjol
membaik, suplay asi adekuat meningkat, tetesan pancaran
asi meningkat.

Observasi:

1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

Rasional : setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan kesiapan dan kemampuan mereka, penyuluh kesehatan dapat menggunakan metode yang lebih efektif.

2) Identifikasi tujuan atau keinginan menyusui

Rasional : penetapan tujuan yang jelas dapat membantu ibu merasa lebih terarah dan fokus.

Terapeutik:

3) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

Rasional : materi yang tertulis seperti buku panduan atau brosur serta video , memungkinkan peserta untuk lebih mudah memahami.

4) Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

Rasional : penjadwalan yang fleksibel memungkinkan pendidikan kesehatan disesuaikan dengan ketersediaan peserta

5) Berikan kesempatan untuk bertanya

Rasional : Proses bertanya mendorong keterlibatan aktif dalam pendidikan kesehatan.

6) Libatkan sistem pendukung: suami, keluarga, tenaga kesehatan dan masyarakat

Rasional : Melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya dalam sesi edukasi menyusui membantu mereka memahami teknik menyusui.

Edukasi:

7) Berikan koseling menyusui

Rasional: Konseling menyusui memberikan informasi yang dibutuhkan ibu tentang teknik menyusui, posisi yang tepat, dan cara perlekatan yang baik.

8) Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi

Rasional : Asi mengandung antibody dan komponen imunologis yang membantu melindungi bayi dari infeksi dan penyakit berkontribusi pada kesehatan jangka panjang bayi.

9) Ajarkan 4 (empat) posisi menyusui dan perlekatan (latch on) dengan benar

Rasional : Dengan posisi yang baik bayi akan merasa lebih nyaman saat menyusui yang dapat meningkatkan ketertarikan dan afektivitas menyusui.

10) Ajarkan perawatan payudara antepartum dengan mengompres menggunakan kapas yang telah diberikan minyak kelapa

Rasional : Minyak kelapa memiliki sifat melembabkan yang baik, sehingga membantu mencegah kulit payudara menjadi kering atau pecah-pecah yang dapat terjadi seiring dengan perubahan ukuran payudara selama kehamilan.

11) Ajarkan perawatan payudara postpartum (misal Memerah ASI, pijat payudara, pijat oksitosin)

Rasional : Menjaga kebersihan payudara dan puting sangat penting untuk mencegah infeksi seperti mastitis dan juga dapat merangsang Asi.

f. Perubahan eliminasi urine

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan Risiko gangguan eliminasi urine teratasi, kriteria hasil yang di dapatkan : sensasi berkemih meningkat, desakan berkemih menurun, distensi kandung kemih menurun, frekuensi BAK membaik.

Manajemen Eliminasi Urine

Observasi:

1) Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urine.

Rasional: Retensi urine adalah ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran urine. Dengan mengidentifikasi tanda dan gejala retensi urine tenaga kesehatan dapat mengelola dengan tepat untuk mengurangi gejala tersebut.

2) Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urine

Rasional: Retensi urine dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk obstruksi mekanis seperti pembesaran prostat sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan yang tepat.

- 3) Monitor eliminasi urine (mis. frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna)

Rasional : Memantau volume, warna dan konsistensi urine dapat membantu mendeteksi masalah seperti infeksi saluran kemih, retensi urine dan obstruksi.

Terapeutik:

- 4) Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih.

Rasional : Data yang dikumpulkan membantu mengidentifikasi faktor pemicu atau pola yang berkaitan dengan inkontinensia atau ketidaknyamanan, memungkinkan intervensi yang lebih tepat.

- 5) Batasi asupan cairan, jika perlu

Rasional : Pada pasien dengan masalah saluran kemih membatasi asupan cairan membantu mengurangi volume urine yang dihasilkan sehingga mengurangi resiko retensi urine dan ketidaknyamanan.

Edukasi:

- 6) Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih.

Rasional : Pemahaman tentang infeksi saluran kemih membantu pasien untuk lebih proaktif dalam perawatan diri sehingga mengurangi risiko komplikasi serius.

- 7) Ajarkan terapi modalitas penguatan otot-otot panggul/berkemih.

Rasional: Bagi wanita pasca melahirkan penguatan otot panggul penting untuk pemulihan dan mencegah masalah kesehatan dimasa depan.

- 8) Anjurkan mengurangi minum menjelang tidur.

Rasional : Pembatasan cairan menjelang tidur dapat mencegah kebocoran urine.

Kolaborasi:

- 9) Kolaborasi pemberian obat supositoria uretra, jika perlu

Rasional : Supositoria uretra seringkali digunakan untuk mengurangi nyeri atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih.

- g. Intoleransi aktifitas

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan intoleransi aktivitas teratasi, kriteria hasil yang di dapatkan : kelemahan menurun.

Manajemen Energi

Observasi

- 1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan

Rasional : Kelelahan dapat disebabkan oleh berbagai gangguan fungsi tubuh seperti anemia.

- 2) Monitor kelelahan fisik dan emosional

Rasional: Kelelahan fisik dan emosional dapat menjadi gejala awal dari berbagai kondisi medis, seperti gangguan tidur, depresi, kecemasan dan penyakit kronis.

3) Monitor pola dan jam tidur

Rasional : Pola tidur yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental, meningkatkan resiko gangguan seperti depresi kecemasandan stress.

4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas

Rasional : Banyak ketidaknyaman fisik yang terjadi selama aktivitas disebabkan oleh teknik atau postur yang buruk serta kelemahan fisik.

Terapeutik

5) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif

Rasional : Rentang gerak aktif dan pasif melibatkan gerakan yang dilakukan oleh pasien sendiri sehingga membantu memperkuat otot-otot yang digunakan untuk menggerakkan sendi serta mencegah kekakuan sendi dan kontraktur.

6) Fasilitas duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan

Rasional: Duduk di sisi tempat tidur merupakan langkah awal yang penting dalam proses rehabilitasi untuk kembali berpindah atau berjalan

Edukasi

7) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap

Rasional: Memulai aktivitas dengan bertahap memungkinkan otot, sendi dan sistem kardiovaskuler beradaptasi dengan tuntutan fisik yang baru /meningkat.

8) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang

Rasional: Kelelahan yang tidak berkurang dapat menjadi tanda kondisi medis yang mendasarinya seperti anemia, gangguan jantung, masalah pernapasan atau kondisi kronis lainnya

9) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

Rasional: Kelelahan seringkali diperburuk oleh stress emosional. Dengan mengajarkan teknik relaksasi seperti napas dalam meditasi atau manajemen waktu yang baik, pasien dapat mengurangi stress yang berkontribusi pada kelelahan.

Kolaborasi

10) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

Rasional : Kelelahan seringkali disebabkan oleh kekurangan nutrisi, seperti zat besi, vitamin B, dan protein. Ahli gizi dapat membantu merancang rencana makan yang kaya akan nutrisi yang diperlukan untuk meningkatkan energi.

h. Defisit pengetahuan

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan pada klien diharapkan Defisit pengetahuan teratasi, kriteria hasil yang di dapatkan verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan atau pengobatan meningkat, perilaku mengikuti program perawatan atau pengobatan meningkat, gelisah menurun.

Edukasi kesehatan

Observasi

1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

Rasional: Untuk memastikan bahwa individu memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menerima informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga informasi dapat diserap dan dipahami dengan baik.

2) Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat

Rasional: Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu untuk menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat, sehingga dapat dikembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi dan mengatasi hambatan.

Terapeutik

3) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

Rasional: Untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga individu dapat memahami dan menerapkan perilaku tersebut.

4) Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

Rasional: Untuk memastikan bahwa pendidikan kesehatan dapat dilakukan secara teratur dan efektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan individu

5) Berikan kesempatan untuk bertanya

Rasional: Untuk memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk memahami informasi yang diberikan dan mengatasi keraguan atau pertanyaan yang mungkin timbul.

Edukasi

6) Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan

Rasional: Untuk meningkatkan kesadaran individu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan dan pengendalian.

7) Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

Rasional: Untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- 8) Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Rasional: Untuk membekali individu dengan strategi yang efektif untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Tindakan Keperawatan (Implementasi)

Implementasi pada Ny.J. M dilakukan selama tiga hari yaitu dari tanggal 1-3 februari 2025.

- a. Implementasi hari pertama dilakukan pada hari/tanggal Sabtu 01 februari 2025 dengan diagnosa pertama yaitu Perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan Hipertensi tindakan yang dilakukan ialah jam 19.00 WITA Memonitor tingkat kesadaran pasien dengan hasil : tingkat kesadaran pasien composmentis, E:4, V:5, M:6=15, jam 19.05 memonitor tanda-tanda vital dengan hasil Td 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37.0 °C SPO₂ 98% RR : 19x/m, jam 19.15 memberikan klien diet rendah garam, jam 19.20 memberikan terapi oral nifedipin 4 x 10 mg. Implementasi hari pertama dengan diagnosa kedua Gangguan nyaman nyeri berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah Jam 19.00 Melakukan pengukuran TD dengan hasil 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37°C, SPO₂ 98% RR : 19x/m. jam 20.00 Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri dengan hasil P: luka post operasi *Sectio Caeserea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah *insisi* dinding abdomen, S: skala nyeri 4 kualitas nyeri 6, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak.. Jam 20.00 penatalaksanaan Melayani injeksi ketorolax 30 mg/Iv dan Memberikan Paracetamol 3x500mg/oral, asmev 3x500Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan

Hipertensi tindakan yang dilakukan ialah jam 19.00 WITA Memonitor tingkat kesadaran pasien dengan hasil : tingkat kesadaran pasien composmentis, E:4, V:5, M:6=15, jam 19.05 memonitor tanda-tanda vital dengan hasil Td 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37.0 °C SPO₂ 98% RR : 19x/m, jam 19.15 memberikan klien diet rendah garam, jam 19.20 memberikan terapi oral nifedipin 4 x 10 mg. implementasi hari pertama dengan diagnosa ketiga Gangguan *integritas* kulit berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah jam 19.05 WITA memonitor tanda-tanda vital dengan hasil Td 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37.0 °C SPO₂ 98% RR : 19x/m. jam 19.10 Mengkaji keadaan luka dengan hasil luka tampak tertutup kasa + hipafix, jam 19.15 memberikan klien minum dan makan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi shingga mempercepat penyembuhan (hasil: pasien makan nasi, sayur, ikan, telur secara perlahan dihabiskan diet pasien rendah garam). Jam 24.00 Melayani terapi oral paracetamol 3x500 gram dan asmef 3x500mg. Implementasi hari pertama dengan diagnosa keempat Risiko infeksi berhubungan dengan luka *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah Jam 18.45 membatasi pengunjung (didalam ruangan hanya 1 orang yang menemani klien dan jam istirahat tidak boleh berkunjung). Jam 18.50 menganjurkan mengonsumsi telur 1 hari 3 butir. jam 19.05 WITA memonitor tanda-tanda vital dengan hasil Td 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37.0 °C SPO₂ 98% RR : 19x/m. jam

19.10 Mengkaji keadaan luka dengan hasil luka tampak tertutup kasa + hipafix, tidak ada bau, edema (-) dan klien mengatakan tidak merasakan gatal pada area insisi dinding abdomen. Implementasi hari pertama diagnosa kelima Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai Asi tindakan yang dilakukan Jam 19.00 Melakukan pengukuran TD dengan hasil 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37⁰C, SPO₂ 98% RR : 19x/m. jam 19.15 mengidentifikasi Asi klien dengan hasil : klien mengatakan Asi klien tidak keluar dan Melakukan palpasi pada payudara untuk mengeluarkan Asi dengan hasil : Asi tidak keluar. Implementasi hari pertama dengan diagnosa keenam Perubahan eliminasi urine tindakan yang dilakukan ialah Jam 19.00 Melakukan pengukuran TD dengan hasil 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37⁰C, SPO₂ 98% RR : 19x/m. jam 20.00 Memonitor eliminasi urine dengan hasil : Volume urine 500 ml warna kuning, terpasang kateter Jam 20.05 Mencatat waktu dan haluar berkemih dengan hasil : Jam 20.00= 500 ml dan jam 06.00= 900 ml. Implementasi hari pertama dengan diagnosa ketujuh intoleransi aktifitas berhubungan dengan Nyeri Luka insisi dinding abdomen dan keterbatasan gerak karena terpasang infus pada kedua tangan serta kateter tindakan yang dilakukan Jam 19.00 Melakukan pengukuran TD dengan hasil 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37⁰C, spo₂ 98% RR : 19x/m. Jam 20.10 Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fsik lainnya dengan hasil klien mengeluh nyeri pada area insisi dinding abdomen dan kedua

tangan pasien tampak terpasang infus RL drip + MgSo₄ + oksitosin. Jam 20.15 Meminta klien untuk miringkan badan ke kiri dan ke kanan dengan hasil pasien bisa melakukannya dan juga meminta pasien untuk menggerakkan kedua kakinya dengan hasil kedua kakinya bisa digerakan. Implementasi hari pertama dengan diagnosa kedelapan Defisit pengetahuan berhubungan dengan tidak kooperatif tindakan yang dilakukan ialah Jam 19.00 Melakukan pengukuran TD dengan hasil 154/89, nadi 88x/menit. Suhu 37⁰C, spo₂ 98% RR : 19x/m. jam 22.30 melakukan pemasangan infus pada klien karena infus sebelumnya terlepas dengan hasil pada saat dilakukan pemasangan infus klien awalnya menolak dan ekspresi klien menunjukkan klien acuh-tak acuh. Jam 24.00 melakukan pengukuran tekanan darah pada klien dengan hasil klien tidak mau dilakukan pengukuran tekanan darah dengan alasan keram pada tangannya.

- b. Implementasi hari kedua pada tanggal 02 februari 2024 diagnosa pertama yaitu Perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan Hipertensi tindakan yang dilakukan ialah Jam 14.00 Melakukan TTV dengan hasil Td: 170/90 mmHg, nadi : 85x/m, suhu : 36,8⁰C, SPO₂ : 98%. RR: 20x/m. jam 14.20 memberikan terapi oral Nivedipine 3x500 mg. Implementasi hari kedua dengan diagnosa kedua ialah Gangguan nyaman nyeri berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah Jam 14.00 Melakukan pengukuran TTV dengan hasil : Td: 170/90 mmHg, nadi : 85x/m, suhu : 36,8⁰C, SPO₂ : 98%.

RR: 20x/m.15.00 Mengidentifikasi karakteristik nyeri dengan hasil dengan karakteristik nyeri P: luka post operasi *Sectio Caeserea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah *insisi* dinding abdomen, skala nyeri dengan hasil : S: 2 dan kualitas nyeri 4, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak. Jam 15.10 Mengidentifikasi faktor lingkungan yang memperberat nyeri dengan hasil : klien mengatakan faktor yang memperberat nyeri adalah cuaca yang panas. Jam 15.20 Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri pada klien dengan hasil : klien mendengarkan dengan baik pada saat di berikan dan bisa mengulangi kembali apa yang sudah diajarkan 16.00 Melayani terapi oral paracetamol dan asam mefenamat 3x500 mg. Implementasi hari kedua dengan diagnosa ketiga Gangguan *integritas* kulit berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah Jam 14.00 WITA melakukan pengukuran TTV pada klien dengan hasil : Td: 170/90 mmHg, nadi : 85x/m, suhu : 36,8^oC, SPO₂ : 98%. Jam 14.10 Mengkaji keadaan luka dengan hasil luka masih tertutup kasa+ hipafix. Jam 16.00 Memberikan terapi oral Paracetamol dan asam mefenamat 3x500mg. Implementasi hari keempat dengan diagnosa Risiko infeksi berhubungan dengan *insisi* dinding abdomen tindakan yang dilakukan ialah Jam 14.00 Melakukan TTV dengan hasil Td: 170/90 mmHg, nadi : 85x/m, suhu : 36,8^oC, SPO₂ : 98%. RR: 20x/m. jam 14.10 mengkaji keadan luka dengan hasil

luka masih tertutup kasa + hipafix, tidak ada bau, edema (-) dan klien mengatakan tidak merasakan gatal pada area insisi dinding abdomen.

Implementasi hari kedua dengan diagnosa keempat ialah Implementasi hari kedua dengan diagnosa kelima menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI tindakan yang dilakukan ialah jam 15.35 Mengidentifikasi kesiapan klien dalam menerima informasi dengan hasil : klien mengatakan siap menerima informasi asalkan didampingi salah satu anggota keluarga. Jam 15.38 Meminta keluarga untuk mendampingi (Ibu dari klien dan suami) Jam 15.40 Memberikan edukasi kepada klien dan keluarga tentang cara perawatan payudara dan pijat oksitosyn serta menjelaskan tujuannya dengan hasil : keluarga tampak serius pada saat diberikan edukasi dan bisa mensimulasikan lagi materi yang sudah diberikan walaupun tidak semuanya dijelaskan dengan baik dan teratur.

Implementasi hari kedua dengan diagnosa keenam Perubahan eliminasi urine tindakan yang dilakukan Jam 14.00 Jam 14.00 Melakukan pengukuran TTV dengan hasil Td: 170/90 mmHg, nadi : 85x/m, suhu : 36,8^oC, SPO₂ : 98%. RR: 20x/m jam 14.05 Memonitor eliminasi urine klien dengan hasil : kateter sudah di lepas dan klien sudah dianjurkan untuk Bak spontan.

Implementasi hari kedua dengan diagnosa ketujuh intoleransi aktifitas berhubungan dengan Nyeri Luka insisi dinding abdomen dan keterbatasan gerak karena terpasang infus pada kedua tangan serta kateter tindakan yang dilakukan ialah jam 16.10

Mengidentifikasi nyeri dan keluhan lainnya dengan hasil : klien mengatakan masih nyeri dengan skala 2 dan kualitas nyeri 3 serta infus 2 jalur sudah dilepas. Jam 16.15 Mengajarkan klien untuk ambulasi dini dengan hasil klien menyetujui untuk melakukan ambulasi dini yaitu dengan meminta klien untuk bangun secara perlahan dari tempat tidur sambil dibantu, duduk di sisi tempat tidur dan berdiri secara perlahan. Implementasi hari kedua diagnosa kedelapan Defisit pengetahuan berhubungan dengan tidak kooperatif tindakan yang dilakukan ialah jam 16.30 Memberikan edukasi kepada klien dan keluarga tentang tujuan dilakukan pemasangan infus, pengukuran tekanan darah dan perawatan payudara dengan hasil : klien dan keluarga tampak kooperatif pada saat diberikan penjelasan tentang perawatan payudara dan pijat oxytocin. Jam 16.38 meminta persetujuan klien untuk melakukan perawatan payudara dan pijat oksitosyn kepada klien dengan hasil klien tidak mau dilakukan perawatan payudara dan mengatakan nanti dirumah baru dilakukan oleh ibunya.

5. Evaluasi

Evaluasi pada Ny. J. M. dilakukan selama tiga hari dari tanggal 01-03 Februari 2025.

- a. Hari pertama evaluasi hari/tanggal sabtu 01 februari 2025, evaluasi dilakukan pada pukul 06.00 pagi dengan diagnosa pertama Perfusi cerebral tidak efektif S:klien mengatakan sakit kepalanya sudah

berkurang, O: TTV : TD : 141/89 mmHg N : 87x/menit S : 37,0°C RR : 20 x/menit SPO₂ : 96 %, tingkat kesadaran pasien composmentis, E:4, V:5, M:6=15, Keadaan umum baik, A: Perfusi serebral tidak efektif teratasi sebagian, P : intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari pertama dengan diagnosa kedua Gangguan nyaman nyeri, S: klien mengatakan masih merasakan nyeri pada bagian perutnya, O: pasien tampak meringis, belum bisa mngontrol nyerinya skala nyeri 2 (kualitas 6), TTV : TD : 141/89 mmHg N : 87 x/menit S : 37.0 °C RR : 20x/menit SPO₂ : 96 %, A : gangguan nyaman nyeri belum teratasi , P : Lanjutkan intervensi. Evaluasi hari pertama diagnosa kelima S : klien mngatakan nyeri pada saat di palpasi payudaranya , O : Asi tida keluar, tampak ada bendungan Asi, TD : 141/89 mmHg N : 87x/menit S : 37,0°C RR : 20 x/menit SPO₂ 96 %, A : menyusui tidak efektif belum teratasi, P : Lanjutkan intervensi. Gangguan *integritas* kulit S : klien mengatakan masih nyeri pada area insisi dinding abdmn, O : Luka tampak tertutup kasa + hipafix, TTV :TD : 141/89 mmHg N : 87x/menit S : 37,5°C RR : 20 x/menit SPO₂ : 96 %, A : gangguan *integritas* kulit belum teratasi , P : Lanjutkan intervensi. Evaluasi hari pertama diagnosa keempat Risiko infeksi S : Klien mengatakan nyeri pada area insisi dinding abdomen, O : Luka tampak tertutup kasa WBC 13.12 10³/ μL, Demam (-), skala nyeri (8), HGB dengan kadar 11,8 mg/dl,cairan berbau busuk (-), TTV : TD : 141/89 mmHg, N : 87x/menit, S : 37,0°C, RR : 20 x/menit, SPO₂ : 96 %, A : Resiko

infeksi tidak terjadi, P : Lanjutkan intervensi. Evaluasi hari pertama
diagnosa kelima S : klien mengatakan nyeri pada saat di palpasi
payudaranya , O : Asi tidak keluar, tampak ada bendungan Asi, TD :
141/89 mmHg N : 87x/menit S : 37,0⁰C RR : 20 x/menit SPO₂ 96 %,
A : menyusui tidak efektif belum teratasi, P : Lanjutkan intervensi.
Evaluasi hari pertama dengan diagnosa keenam S : -, O: volume urine
pada pukul 06.00 sebanyak 90 ml warna kuning, terpasang kateter, A :
perubahan eliminasi urine teratasi sebagian , P : intervensi dilanjutkan.
Evaluasi hari pertama dengan diagnosa ketujuh S: klien mengatakan
masih pusing dan mengeluh nyeri pada area *insisi* dinding abdomen ,O:
pasien masih tampak pusing , meringis , TD : 141/ 89 mmHg , nadi
87x/menit, suhu : 37.0 ⁰C, dan SPO₂ : 96%, A: intoleransi aktifitas
teratasi sebagian, P: intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari pertama
dengan diagnosa kedelapan S : klien mengatakan tangan keram pada
saat dilakukan pengukuran Td, O: klien tidak mau pada saat dilakukan
pengukuran tekanan darah dan pemasangan infus, tampak terpasang
infus 2 jalur pasien masih tampak pusing, meringis, TD : 141/ 89
mmHg , nadi 87x/menit, suhu : 37.0 ⁰C, dan SPO₂ : 96%, A:
intoleransi aktifitas teratasi sebagian, P: intervensi dilanjutkan.

- b. Evaluasi hari kedua pada hari/ tanggal: minggu 02 februari 2025 Jam
19.00 dengan diagnosa pertama Perfusi cerebral tidak efektif S: klien
mengatakan sudah tidak lagi sakit kepala, O: kesadaran
Composmentis. 145/94 mmHg, nadi : 89x/m, Spo₂ :96%, S: 36,8⁰C,

RR: 20x/m, A: Perfusi cerebral sebagian teratasi , P: intervensi di lanjutkan. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa kedua Gangguan nyaman nyeri S: klien mengatakan rasa nyeri pada area *insisi* dinding abdomen berkurang O: skala nyeri 2, kualitas nyeri 4, TD: 145/94mmHg, nadi 89 x/m, RR: 19x/m, SPO₂ : 96% , S: 36,8⁰C, A : Gangguan nyaman nyeri teratasi sebagian, P: intervensi dilanjutkan.

ketiga Gangguan *integritas* kulit S: klien mengatakan masih nyeri pada area *insisi* dinding abdomen O: tampak luka masih tertutup kasa + hipafix, TD : 145/94 mmHg, nadi : 89x/m, SPO₂ : 96%, S: 36,8⁰C, RR: 20x/m, A: Gangguan *integritas* kulit belum teratasi, P: intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa kedua Evaluasi hari kedua dengan diagnosa keempat Risiko infeksi S : Klien mengatakan nyeri pada area insisi dinding abdomen, O : Luka tampak tertutup kasa WBC 13.12 10³/ μL, Demam (-), skala nyeri (2) kualitas nyeri 4, HGB dengan kadar 11,8 mg/dl, cairan berbau busuk (-), TD : 145/94 mmHg, nadi : 89x/m, SPO₂ : 96%, S: 36,8⁰C, RR: 20x/m A : Risiko infeksi tidak terjadi, P : Lanjutkan intervensi. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa kelima menyusui tidak efektif S: klien tidak mau dilakukan perawatan payudara, O : pada saat diberikan edukasi klien dan keluarga tampak mendengar dengan baik edukasi perawatan payudara dan pijat oxytocin, TD: 145/94mmHg, nadi 89 x/m, RR: 19x/m, Spo₂ : 96% , S: 36,8⁰C, A: menyusui efektif teratasi sebagian , P: intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa keenam

perubahan eliminasi urine S: klien mengatakan sangat nyaman karena kateter sudah di lepas , O: klien tampak tenang , kateter sudah dilepas , TD: 145/94mmHg, nadi 89 x/m, RR: 19x/m, SPO₂. : 96% , S: 36,8⁰C, A: perubahan eliminasi urine teratasi, P : intervensi dihentikan. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketujuh intoleransi aktivitas S: klien mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena sudah bisa berjalan secara perlahan dari tempat tidurnya ke Wc, dan keluar untuk menghirup udara segar, O : klien tampak senang, tampak sudah bisa berjalan secara perlahan, klien tampak tenang , kateter sudah dilepas , TD: 145/94mmHg, nadi 89 x/m, RR: 19x/m, SPO₂. : 96% , S: 36,8⁰C, A: intoleransi aktifitas teratasi, P: intervensi dihentikan. Evaluasi hari kedua dengan diagnosa kedelapan Defisit pengetahuan S: klien mengatakan tidak mau dilakukan perawatan payudara, O : klien tampak tenang saat dilakukan pengukuran tekanan darah, keluarga tampak mendengar dengan baik pada saat di berikan edukasi perawatan payudara dan pijat oxytocin, TD: 145/94mmHg, nadi 89 x/m, RR: 19x/m, SpO₂. : 96% , S: 36,8⁰C, A: defisit pengetahuan teratasi sebagian P : intervensi dilanjutkan.

Catatan Perkembangan (03 Februari 2025)

Catatan perkembangan hari ketiga dengan diagnosa pertama Perfusi cerebral tidak efektif Jam 07.00 Evaluasi S: -, O: kesadaran compocmentis, TTV : 140/89 mmHg N : 78 x/menit S : 36,6 ⁰C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 % , A: Perfusi cerebral sebagian teratasi , P : intervensi

dilanjutkan. Jam 10.00 I: Melakukan pengukuran Tekanan darah dengan hasil 160/96 mmHg 10.30 Melayani terapi oral nifedipine 3x500mg, jam 10.50 Menganjurkan pasien untuk diet rendah garam, jam 10.00 E: S:-, O: TD : 131/90 mmHg, suhu 37.0⁰C, nadi : 85x/m, Spo2:98%, RR : 20x/m. A: Perfusi serebral efektif teratasi , P: intervensi dihentikan (pasien pulang hari ini). Catatan perkembangan hari ketiga dengan diagnosa kedua Gangguan nyaman nyeri Jam 07.00 E :S : klien mengatakan masih merasakan nyeri, O : Nampak tenang, TTV : TD : 140/89 mmHg N : 78 x/menit S : 36,6 ⁰C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 %, A : Gangguan nyaman nyeri teratasi sebgaiian P : Lanjutkan intervensi. Jam 07.30 I :Melayani paracetamol dan asam mefenamat 3x500 mg/oral, jam 07.40 Mengidentifikasi skala nyeri pasien dengan hasil : 3, jam 10.00 Mengukur tekanan darah dengan hasil TD: 160/90 mmHg. Jam 10.05 Melayani terapi oral Nifedipine 3x500 mg, jam 11.00 E : S : Klien mengatakan masih merasakan nyeri. O: Klien nampak tenang, karakteristik nyeri P: luka post operasi *Sectio Caeserea* pada dinding abdomen, Q: klien mengatakan nyeri teriris – iris, R: nyeri pada daerah *insisi* dinding abdomen, skala nyeri dengan hasil : skala nyeri 2, kualitas nyeri 2, T: klien mengatakan nyeri hilang muncul dan nyeri bertambah ketika bergerak. TTV : TD : 131/90 mmHg, nadi 85x/m, Spo2 : 98%, S: 36,8%, A : Gangguan Nyaman Nyeri teratasi, P : intervensi dihentikan Pasien rencana pulang hari ini pukul 11.30, Kolaborasi pemberian terapi oral paracetamol dan asam mefenamat 3x500m. Catatan perkembangan hari ketiga dengan diagnosa

ketiga Gangguan *integritas* kulit Jam 07.00 S : -, O :TTV : TD : 140/89 mmHg N : 77 x/menit S : 36,6 °C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 %, A : Gangguan *integritas* kulit belum teratasi , P : Lanjutkan intervensi, I : jam 09.00 Menganjurkan klien untuk makan putih telur dengan tujuan untuk mempercepat poses pengeringan dan penyembuhan luka, minum obat sesuai dengan yang sudah dijelaskan dan menganjurkan untuk mobilisasi (jalan sekitar rumah) jika sudah dirumah nanti, jam 09.30 E: S : -, O :warna luka merah muda, tidak ada bau, tidak bernanah, ukuran luka > 10 cm, luka sudah dibaluti kasa + hipafix, TTV : TD : 160/96 mmHg,N : 78 x/menit,S : 36,6 °C,RR : 19 x/menit, SPO₂: 99 %, A : Gangguan *integritas* kulit teratasi, P : intervensi dihentikan. Pasien hari ini direncanakan pulang dan 3 hari setelah keluar dari Rs perawatan luka dilanjutkan di puskesmas. Catatan perkembangan hari ketiga dengan diagnosa keempat Risiko infeksi Jam 07.00 E:S: -, O : WBC 19,9 10³/ μL, Demam (-), nyeri menurun (3), HGB membaik dengan kadar 12.2 mg/dl, bengkak (-), TTV : 140/89 mmHg N : 78 x/menit S : 36,6 °C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 % A : risiko infeksi tidak terjadi P : Lanjutkan Intervensi. Jam 07.30 I : Melayani terapi oral paracetamol dan asam mefenamat 3x500, jam 08.50 Mencuci tangan sebelum melakukan perawatan luka pada klien. 09.00 Memberikan perawatan luka kepada klien dengan teknik steril, jam 09.35 Menjelaskan tanda gejala infeksi pada klien dan keluarga. Jam 11.00 E : S: - , O : Demam (-), nyeri menurun (3), HGB dengan kadar 12,2 mg/dl, bengkak (-), cairan berbau busuk (-) , A : risiko infeksi tidak terjadi, P : intervensi

dihentikan. Catatan perkembangan hari ketiga dengan diagnosa kelima

Jam 07.00 E: S: klien mengatakan tidak mau melakukan perawatan payudara dan klien mengatakan dirumah saja nanti dilakukan perawatan dan pijat oksyotxin oleh keluaranya, O: klien tampak tenang, TTV : TD : 140/89 mmHg N : 78 x/menit S : 36,6 °C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 % A: menyusui tidak efektif teratasi sebagian, P: intervensi dilanjutkan. Jam 08.20 dilanjutkan I : Mengidentifikasi tentang pemahaman klien dan keluarga tentang perawatan payudara dan pijat oxytocin dengan hasil keluarga bisa menjelaskan kembali sesuai yang sudah di ajarkan kemarin.

Jam 08.30 E :S :- O: klien dan keluarga tampak bisa menjelaskan kembali tentang perawatan payudara dan pijat oxytocin. A: menyusui efektif teratasi sebagian P : intervensi dilanjutkan di rumah Pasien rencana pulang hari ini pukul 11.30. Catatan perkembangan hari kedua dengan diagnosa kedelapan Defisit pengetahuan Jam 07.00 E: S: - O: klien tampak tenang pada saat dilakuakn pengukuran Td dengan hasil : 140/89 mmHg N : 78 x/menit S : 36,6 °C RR : 18 x/menit SPO₂ : 98 % A : Defisit pengetahuan teratasi sebagian P : intervensi dilanjutkan. Jam 08.20 I: Mengidentifikasi perasaan klien setelah dilakukan edukasi : klien mengatakan bahwa dirinya sudah bisa tenang setelah mendengarkan edukasi yang sudah diberikan kemari. Jam 11.00 E: S: - O: klien tampak tenang ketika dilakukan pengukuran tekanan darah A: Defisit pengetahuan teratasi P: intervensi dihentikan.



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/>; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Maria Yasinta Menteng
Nomor Induk Mahasiswa : PO5303202220020
Dosen Pembimbing : Marthina Bedho, S.ST., M.Kes
Dosen Penguji : Dr. Sisilia Leny Cahyani, S.Kep,Ns.,MSc
Jurusan : Program Studi DIII Keperawatan Ende
Judul Karya Ilmiah : **ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. J.M. POST
SECTIO CAESERIA (SC) DENGAN INDIKASI PRE-EKLAMPSIA BERAT DI RUANG
NIFAS III RSUD ENDE**

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **27,77%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 03 Juli 2025

Admin Strike Plagiarism



Murry Jermias Kale SST
NIP. 19850704201012100



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN ENDE

LEMBAR KONSUL PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : Maria Yasita Menteng

NIM : PO5303202220020

NAMA PEMBIMBING : Marthina Bedho, S.ST., M. Kes.

No	Tanggal	Materi	Rekomendasi Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Senin 26 Agustus 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	<p>Bab I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edit ketikan, baca dan pahami titik komanya 2. Pada latar belakang perhatikan introduction/pembuka, teorinya jangan terlalu banyak, masalah, data dunia indonesia dst cukup yang diperlukan saja dan harus menggunakan persen serta tambahkan penatalaksanaan dan dampak 3. Buat proposal KTI harus berdasarkan panduan 	
2	Selasa 27 Agustus 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urutkan seperti yang lama 2. Lengkapi data di kabupaten Ende 3. Lanjut ke Bab II dan selesaikan Bab I 4. Gunakan bahasa yang baik dan benar 5. Perhatikan penulisan kata depan, keterangan tempat dll 6. Perhatikan penulisan huruf kapital 	

3	Selasa 27 Agustus 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pathway dst hanya satu konsep 2. Hanya masalah keperawatan yang diberi kotak 3. Baca asal Lochea 4. Analisa data dan manifestasi data lengkap serta tambahkan pengumpulan data perpola 5. Etiologi ikut pathway 	
4	Jumad 30 Agustus 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Bab II <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep Nifas b. Konsep SC 2. Pathway disatu 3. kan 4. Lanjut konsep Askep 	
5	Jumad 13 September 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pathway ACC dan lanjutkan yang lainnya 2. Perhatikan huruf, spasi, dan nama gelar, dosen harus jelas 3. Penatalaksanaan medis (obat-obatan), tambahkan penatalaksanaan ibu nifas : TFU, Lochea, nyeri, Nutrisi, efek anestesi 4. Selesai edit siap untuk ujian 5. Analisa data lengkapi lagi 6. Bab III prosedur studi kasus tambahkan minta surat ijin kepro untuk studi kasus dokumentasi tambahkan hasil pemeriksaan laboratorium 	
6	Selasa 03 Desember 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	ACC Ujian proposal dan silahkan hubungi dosen penguji	
7	Jumad 02 Desember 2024	Ibu Nifas Post SC dengan Indikasi Preeklampsia	Konsultasi PPT	

8	Selasa 23 Desember 2024	Ibu Nifas Post <i>Sectio Caeserea</i> dengan indikasi preeklampsia	Pengeditan huruf di pathway harus jelas dan lengkap	A B
---	-------------------------------	---	--	--------

Mengetahui
Ketua Program Studi DIII Keperawatan Ende



Aris Wawonco, M.Kep.Ns., Sp.Kep.Kom
NIP. 19660114199102100



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN ENDE

LEMBAR KONSUL KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : Maria Yasita Menteng
NIM : PO5303202220020
NAMA PEMBIMBING : Marthina Bedho, S.ST., M. Kes.

No	Tanggal	Materi	Rekomendasi pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Selasa, 11 Februari 2025	Asuhan keperawatan pada klien Ny. J. M. Post <i>Sectio Caesarea</i> dengan Indikasi Preeklampsia Berat di Nifas III RSUD Ende.	<ol style="list-style-type: none">1. Lengkapi setiap masalah keperawatan dengan ntervensinya masing-masing2. Diagnosa gangguan eliminasi danti dengan perubahan eliminasi urine3. Persepsi pasien : pasien tidak mau dipasang infus, dilakukan perawatan payudara dala perawatan (kurang kooperatif)4. Tambahkan diagnosa keperawatan menyusui tidak efektif5. Tambahkan kontraksi uterus konsistensinya keras, depresi (tidak menangis).6. Carilah alasan garam bisa menyebabkan tekanan daah meningkat.	

2		Asuhan keperawatan pada klien Ny. J. M. Post <i>Sectio Caeserea</i> dengan Indikasi Preeklampsia Berat di Nifas III RSUD Ende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cari fungsi garam dalam tubuh dan diluar tubuh 2. Bab 4 studi kasus: Pembahasan pada pengkajian lihat pada analisa data. 3. Pemeriksaan urine (Neg) 4. Perhatikan kata/ kalimat yang masih kurang 5. Penutupan berdasarkan tujuan . 	<i>J</i>
3		Asuhan keperawatan pada klien Ny. J. M. Post <i>Sectio Caeserea</i> dengan Indikasi Preeklampsia Berat di Nifas III	ACC lanjutkan buat PPT	<i>J</i>
4	Selasa, 18 Maret 2025	Asuhan keperawatan pada klien Ny. J. M. Post <i>Sectio Caeserea</i> dengan Indikasi Preeklampsia Berat di Nifas III	Konsultasi PPT Lengkapi lagi pada pembahasan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi	<i>J</i>
5	Kamis 15 Mei 2025	Asuhan keperawatan pada klien Ny. J. M. Post <i>Sectio Caeserea</i> dengan Indikasi Preeklampsia Berat di Nifas III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edit lagi huruf lebih /kurang dan diakhir kalimat ada titik 2. Pada Kasus tambahkan rasional 3. Edukasi pada kasus : diet rendah garam. 	<i>J</i>



Mengetahui
Ketua Program Studi DIII Keperawatan Ende

Aris Wawomeo, M.Kep.Ns., Sp.Kep.Kom

NIP. 19660114199102100



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN ENDE

LEMBAR KONSUL PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : Maria Yasinta Menteng
NIM : PO5303202220020
NAMA PENGUJI : Dr. Sisilia Leny Cahyani, S.Kep.Ns.,MSc

No	Tanggal	Materi	Rekomendasi Penguji	Paraf Penguji
1	Senin, 16 Desember 2024	Ibu Nifas Post Sectio Caeserea Dengan Indikasi Preeklampsia	1. Pengeditan judul 2. Perhatikan spasi pada judul (1.5) 3. Penyusunan materi di BAB 2 meliputi : konsep nifas, konsep Preeklampsia dan konsep SC 4. Penyusunan pathway harus secara berurutan 5. Lengkapi pengkajian	
2	Selasa 23 Desember 2024	Ibu Nifas Post Sectio Caeserea Dengan Indikasi Preeklampsia	ACC Lanjut penelitian	



Mengetahui
Ketua Program Studi DIII Keperawatan Ende

Aris Wawomeo, M.Kep.Ns., Sp.Kep.Kom

NIP. 19660114199102100

RIWAYAT HIDUP



A. Data diri

Nama : Maria Yasinta Menteng
Tempat Tanggal Lahir : Mbarungkeli 27 juni 2003
Alamat : Pandulundur
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik

B. Riwayat Pendidikan

1. SDK Mbarungkeli
2. SMPN 1 Riung
3. SMAK Kejoran Riung
4. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang : 2022-2025
Program Studi DIII Keperawatan Ende

MOTTO

“Kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju kesuksesan dan kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering anda jatuh, tetapi seberapa sering anda bangkit kembali”