

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebelum diberikan intervensi *water tepid sponge* (WTS) kedua responden mengalami hipertermia dengan nilai rata-rata suhu tubuh yaitu 37,9°C.
2. Setelah diberikan intervensi *water tepid sponge* selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil bahwa pada kedua responden mengalami penurunan suhu tubuh dengan nilai rata-rata yaitu 37,2°C.
3. Intervensi *water tepid sponge* dapat dijadikan salah satu intervensi keperawatan mandiri untuk menurunkan demam karena terbukti efektif menurunkan suhu tubuh pada anak dengan demam.

5.2 Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan
Peneliti mengharapkan dapat dijadikan sebagai referensi baru dalam memberikan informasi mengenai penerapan terapi nonfarmakologis salah satunya *water tepid sponge* untuk menurunkan suhu tubuh pada anak dengan hipertermia.
2. Bagi Responden
Peneliti mengharapkan teknik *water tepid sponge* dapat dipahami dan dilakukan oleh orang tua untuk menurunkan suhu tubuh pada anak dengan hipertermia.
3. Bagi Pelayanan Kesehatan
Memberikan informasi kesehatan mengenai penanganan nonfarmakologi tentang permasalahan yang berkaitan dengan hipertermia yaitu dengan *water tepid sponge*.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama atau kombinasi dengan metode lainnya.